

โรคพิษสุนัขบ้า



เกิดจากเชื้อ **เรบีสไวรัส (Rabies Virus)**
มีสัตว์เสี่ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย
ลิง หนู หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค

ผู้ติดเชื้อมีอาการ ตาย 100%



กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า 15 ปี




ถูกกัด ข่วน
แล้วไม่ฉีดวัคซีน

การติดต่อ

ถูกสัตว์มีเชื้อ

- กัด
- ข่วน
- เลียบบาดแผล

อาการผู้ป่วย



ดูอย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะเริ่มแรก

- นิสัยเปลี่ยน ไม่ร่าเริง
- หงุดหงิด เก็บตัว
- ทวาดระแวง ม่านตาขยาย


ระยะตื่นเต้น

- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- เทำหอน

ระยะอัมพาต


- น้ำลายไหล
- คางห้อยตก
- ล้มลง ตาย

คำแนะนำเมื่อถูกกัด-ข่วน-เลีย



ล้างแผล

ด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง



ใส่ยา

เบตาดีน



กักหมา-แมว

เพื่อสังเกตอาการ 10 วัน



หาหมอ

หากฉีดวัคซีนต้องมาตามนัดทุกครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง



ฉีดวัคซีน

โรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



เสี่ยงในรั้วบ้าน

ออกนอกบ้านต้อง **ใส่สายจูง**



ฝึกให้ **เชื่อฟังคำสั่ง**



ทำหมัน **คุมกำเนิด**

คาถา 5 ข. กันสุนัขกัด

- ข1** อย่าแหง
- ข2** อย่าเหยียบ
- ข3** อย่าแหยก
- ข4** อย่าหยิบ
- ข5** อย่ายุ่ง



ทำให้สุนัขโกรธ



ทาง หิว ตัว ขา
ให้สุนัขตกใจ



สุนัขที่กัดกัน
ด้วยมือเปล่า



อาหารที่สุนัข
กำลังกิน



กับสุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือไม่มีเจ้าของ